



(FR)

Pansement Coricide

Indications

Protection et traitement des Cors, Oeils de perdrix et Durillons
Pansements adhésifs en sachet.

Conseils d'utilisation

Appliquer le pansement une fois par jour après un bain de pied chaud, sur la lésion sans déborder sur la peau saine, de préférence le soir au coucher.

Contre-indications

Le pansement ne doit pas être utilisé :

- en cas d'allergie aux salicylés, à la cire d'abeille ou à un autre composant.
- en cas de cors infectés.
- chez les enfants de moins de 16 ans.
- en cas d'artérite, de diabète, de neuropathie, de problème de circulation sanguine ou de déficience de la circulation périphérique.
- sur une peau irritée, infectée ou avec des rougeurs.

Précautions d'emploi

Un même pansement ne doit pas être appliqué plus de 24 heures pour éviter les risques de macération qui peuvent endommager la peau et engendrer un risque d'infection. Ne pas utiliser le produit plus de 8 jours.

En l'absence d'améliorations après 8 jours de traitement, consultez votre pédicure/podologue. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ce produit est caustique. Le produit doit être bien positionné sur le cor ou la callosité. Ne pas déborder en dehors de la zone à traiter. Les personnes ne pouvant pas appliquer le pansement eux-mêmes, dont les personnes âgées, doivent se faire aider par une personne de leur entourage. Arrêter l'application en cas de survenue de douleurs.

L'avis d'un médecin est requis avant toute utilisation pour: Les personnes avec une peau fine ou les personnes âgées. Les personnes ayant une dermatose du pied. Les personnes ayant une diminution des sensations sur leur pied. En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récurrence, consulter votre médecin. Il peut être utile de rechercher la cause et de la traiter en conséquence (mesures orthopédiques de correction de l'appui, modifications du chaussage).

En cas de doute, demander l'avis de votre pharmacien ou médecin.

Effets indésirables

En raison de la présence d'acide salicylique, ce produit peut provoquer des réactions cutanées (irritations, brûlures, allergies, érythèmes, desquamation, sensations de brûlures, picotements) notamment en cas d'application sur la peau saine.

La réutilisation d'un produit à usage unique peut provoquer des risques d'infection.

Conservation

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Composition

Acide salicylique : 32mg

Excipients : cire d'abeille blanche, glycérides polyglycolysés saturés, silice colloïdale hydrophobe, chlorophylle cuivrée.

Contenu de la boîte

6 pansements adhésifs avec acide salicylique en sachets.

(NL)

Coricide Pleister

Toepassing

Bescherming en behandeling van likdoorns, eksterogen en eelt.
Zelfklevende pleisters in zakjes.

Gebruiksaanwijzing

Breng de pleister eenmaal per dag aan op het letsel, maar niet op de omliggende gezonde huid. Doe dat gedurende maximaal 8 dagen, na een warm voetbad, bij voorkeur voor u 's avonds gaat slapen.

Contra-indicaties

De pleister mag niet worden gebruikt:

- In geval van een allergie voor salicylaten, bijenwas of andere - ingrediënten.
- In geval van ontstoken likdoorns.
- Bij kinderen jonger dan 16 jaar.
- In geval van arteritis, diabetes, neuropathie, stoornissen in de bloedsomloop of deficiëntie in de perifere bloedsomloop.
- Op geïrriteerde, ontstoken of rode huid.

Gebruiksvoorzorgen

Dezelfde pleister mag niet langer dan 24 uur worden gebruikt om het risico op maceratie te voorkomen, omdat dit de huid kan beschadigen en een risico op ontsteking kan veroorzaken. Gebruik het product niet langer dan 8 dagen. Neem contact op met uw podotherapeut als er na 8 dagen geen verbetering is. Buiten het bereik van kinderen houden. Dit product is bijtend. Het product moet goed op de eeltplek of de likdoorn worden geplaatst. Niet gebruiken buiten het te behandelen gebied. Mensen die niet zelf de pleister kunnen aanbrengen, zoals ouderen, moeten hulp krijgen van iemand uit hun

omgeving. Stop het gebruik als pijn optreedt. Voor elk gebruik is de opinie van een arts vereist voor: Mensen met een dunne huid of ouderen. Mensen met voetdermatose. Mensen met een beperkt gevoel aan hun voeten. Als de behandeling niet werkt indien deze correct wordt toegepast, of als de verschijnselen terugkeren, neem dan contact op met een arts. Het kan nuttig zijn om de oorzaak te onderzoeken en dienovereenkomstig te behandelen (orthopedische ondersteunende corrigerende maatregelen, aanpassing van het schoeisel). Vraag bij twijfel advies aan uw apotheker of arts.

Bijwerkingen

Vanwege de aanwezigheid van salicylzuur kan dit product huidreacties veroorzaken (irritatie, brandwonden, allergieën, erytheem, roos, branderig gevoel, tintelingen), vooral bij gebruik op een gezonde huid. Het hergebruik van een product voor eenmalig gebruik kan een risico op infectie met zich meebrengen.

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur lager dan 25°C.

Samenstelling

Salicylzuur: 32 mg

Hulpstoffen: witte bijenwas, verzadigde polygeglycolyseerde glyceriden, hydrofoob colloïdaal siliciumdioxide, koperchlorofyl.

Inhoud van de verpakking

6 zelfklevende pleisters met salicylzuur in een zakje.



Coricide Pflaster

Anwendungsgebiet

Schutz und Behandlung von Schwielen, Hühneraugen und Hornhaut. Klebepflaster im Beutel.

Anwendungsanweisung

Wenden Sie das Pflaster einmal täglich, vorzugsweise abends vor dem Schlafengehen und nach einem heißen Fußbad auf die geschädigte Haut, ohne die gesunde Haut zu berühren.

Gegenanzeigen

Das Pflaster darf nicht verwendet werden:

- Im Falle einer Allergie gegen Salicylate, Bienenwachs oder andere Bestandteile.
- Bei entzündeten Hühneraugen.
- Bei Kindern unter 16 Jahren
- Bei Arteriitis, Diabetes, Neuropathie, Durchblutungsstörungen oder peripheren Durchblutungsstörungen.
- Bei gereizter, entzündeter oder geröteter Haut.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Das gleiche Pflaster sollte nicht länger als 24 Stunden angewendet werden, um das Risiko einer Mazeration zu vermeiden, die die Haut schädigen und ein Entzündungsrisiko darstellen kann. Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 8 Tage. Wenn nach 8 Tagen keine Besserung eintritt, wenden Sie sich an Ihren Fußpfleger/ Fußarzt. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dieses Produkt ist ätzend. Das Produkt muss gut auf der Schwielen oder Hornhaut platziert werden. Nicht außerhalb des zu behandelnden Bereichs anwenden. Personen, die das Pflaster nicht selbst anlegen können, einschließlich älterer Menschen, sollten sich helfen lassen. Unterbrechen Sie die Anwendung bei Auftreten von Schmerzen.

Die Meinung eines Arztes ist vor jeder Verwendung erforderlich für: Personen mit dünner Haut oder ältere Personen. Personen mit Fußdermatose. Personen mit eingeschränkter Empfindung an ihren Füßen. Wenn die Behandlung bei ordnungsgemäß durchgeführter Anwendung nicht anspricht, oder wenn bei Rückfall, wenden Sie sich bitte an einen Arzt. Es kann nützlich sein, die Ursache zu erforschen und entsprechend zu behandeln (orthopädische Stützkorrekturmaßnahmen, Anpassung des Schuhwerks). Lassen Sie sich im Zweifelsfall von Ihrem Apotheker oder Arzt beraten.

Nebenwirkungen

Aufgrund des Vorhandenseins von Salicylsäure kann dieses Produkt Hautreaktionen hervorrufen (Reizungen, Verbrennungen, Allergien, Erytheme, Schuppenbildung, Brennen, Kribbeln), insbesondere bei Anwendung auf gesunder Haut. Die Wiederverwendung eines Einmalproduktes kann zu Entzündungsrisiken führen.

Aufbewahrung

Unter 25°C aufbewahren.

Zusammensetzung

Salicylsäure: 32 mg

Zusatzstoffe: weißer Bienenwachs, gesättigte polyglykolysierte Glyceride, hydrophobes kolloidales Siliciumdioxid, Kupferchlorophyll.

Packungsinhalt

6 selbstklebende Pflaster mit Salicylsäure im Beutel.



Date d'apposition du marquage CE
Datum van CE-markering/ Datum der CE-Kennzeichnung: 2020
Dernière révision de la notice / Laatstse revisie van de bijsluiter
Letzte Überarbeitung des Beipackzettels: 06/2020

CE 0459